

تهوع و استفراغ بارداری

آموزش به مادر

چند توصیه جهت بهبودی

- استفاده از زنجبیل تازه به صورت ماده افزودنی، تهوع را کنترل می کند. از این ماده همچنین می توان به شکل های دیگر مانند چای، اسانس، کپسول، قرص، بسکوئیت و کیک استفاده کرد.
 - خوردن سالاد و غذاهای سهل الهضم و میان وعده های سبک به جای غذاهای سنگین
 - خوردن نان خشک قبل از بلند شدن از بستر خواب چون کاهش قند خون خود یکی از علل آنها و عوامل استفراغ است.
 - پرهیز از بوهای محرک
 - خوردن صبحانه نیم ساعت بعد از بیدار شدن از خواب
 - ریزه خواری و خوردن چیزهای خشک نظیر بیسکوئیت ترد و نان خشک در طول روز
 - کاهش حجم مواد غذایی مصرف شده و افزایش تعداد دفعات تغذیه
 - نخوردن مایعات تا نیم ساعت بعد از غذا
 - ورزش منظم و درمان دارویی
 - در صورت ادامه داشتن یا شدید بودن تهوع و استفراغ و بهبود نیافتن با توصیه های فوق، پزشک شما بستری شدن در بیمارستان را توصیه خواهد کرد.
- اگر ویاار مادر تمایل به خوردن غذاهای عجیب و غریب نظیر نشاسته، برفک یخچال، خاک رس و.... باشد، احتمالاً مادر دچار کمبود آهن است**

روش های درمان در بیمارستان

- (1) مایع درمانی با استفاده از سرم
- (2) استفاده از داروها طبق دستور پزشک
- (3) دادن آرامش روحی و نداشتن استرس

طراحی و چاپ: روابط عمومی بیمارستان آتیه
آدرس بیمارستان:

شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان

تلفن بیمارستان: 82721

فاکس بیمارستان: 88086095

www.atiehospital.ir



تهیه کننده: اتاق زایمان و واحد آموزش

تأیید کننده: رئیس اتاق زایمان

تاریخ تدوین: 1396/5/1


تاریخ آخرین بازنگری: 1401/6/1

تاریخ بازنگری بعدی: 1405/6/1

ویرایش: 02

کد: ATH-ED/ED- 08

منبع: راهنمای کشوری ارائه خدمات مایمی و زایمان (بازنگری سوم)



تعریف

در اولین هفته های حاملگی شایع ترین نشانه ای که وجود دارد تهوع و غالباً استفراغ است که هر چند به این اختلال «ناراحتی صبحگاهی» می گویند ولی می تواند در هر ساعتی از شبانه روز رخ دهد. غالباً این حالت هنگامی که به مقدار کافی غذا نخورده اید بروز می کند، بنابراین همیشه مقداری غذای سبک مانند بیسکوئیت خشک یا میوه تازه همراه داشته باشید.

از آنجا که حاملگی حس بویائی را افزایش می دهد بعضی از غذاهای می توانند باعث تحریک و آغاز تهوع شوند که نمونه های متداول آن ها عبارتند از چای، قهوه، شکلات و غذاهایی که حاوی چربی با قند زیاد هستند. ممکن است حتی بوی عطر مورد علاقه شما باعث ایجاد تهوع شود.

علت

در طول بارداری به دلیل تغییرات هورمونی و سایر تغییرات ایجاد شده در بدن مادر، شکایت تهوع و استفراغ مطرح می شود. شیوع آن در بارداری 50% است. معمولاً بین اولین و دومین قاعدگی فراموش شده یعنی حدود 4 هفته بارداری به دلیل تغییرات هورمونی (استروژن و پروژسترون و)

شروع شده و حدود هفته 14 تا 16 پایان می یابد. جهت رفع آن می توان یک سری توصیه ها را ارائه داد. هر چند با این توصیه ها درمان کاملاً موفقیت آمیز نیست ولی شدت ناراحتی مادر را کم می کند.