

خونریزی های مامایی

آموزش به بیمار

طبق بررسی های پزشک اگر جفت سرراهی باشد مددجو بایستی استراحت مطلق داشته و توصیه های بهداشتی و درمانی طبق صلاحدید پزشک داشته باشد.

تعریف جدا شدن جفت (دکولمان)

منظور از دکولمان جفت کنده شدن جفت از محل خود را گویند که منجر به خونریزی شدید واژینال می شود.

علائم

شدت جدا شدن جفت (دکولمان) اغلب بسته به این که شخص در پی بروز علائم تا چه زمانی خود را به بیمارستان برساند ، متفاوت است.

- 1) خونریزی روشن واژینال
- 2) حساسیت رحم در زجر جنین
- 3) انقباضات پشت سر هم و مکرر
- 4) انقباضات شدید (هیپرتونیک) و جنین مرده در حدود کمتر از یک پنجم موارد می باشد.

- 5) از دیگر نشانه ها شوک و افت فشار خون مادر است


درمان

در هر زن دچار خونریزی واژینال در سه ماهه سوم بارداری، لزوم وضع حمل باید طبق صلاحدید پزشک باشد. در این شرایط مادر سرم تراپی و اکسیژن تراپی شده و به سرعت تیم احیای نوزاد و احیای اتاق عمل و اتاق زایمان جهت سزارین مادر آماده می شود.

در اغلب موارد جدا شدن جفت، باید اقدامات سریع و اورژانسی انجام شود زیرا هر لحظه امکان مرگ جنین وجود دارد.

آموزش به مادر

در صورت بروز هر گونه خونریزی در اسرع وقت به بیمارستان مراجعه نمایید. بهتر است در وضعیت دراز کشیده و با وسیله نقلیه مناسب به بیمارستان منتقل شوید و در این هنگام آمادگی های لازم را در صورت لزوم به ختم بارداری داشته باشید.



تهیه کننده: اتاق زایمان و واحد آموزش

تأیید کننده: رئیس اتاق زایمان

تاریخ تدوین: 1396/5/1

تاریخ آخرین بازنگری: 1401/6/1

تاریخ بازنگری بعدی: 1405/6/1

ویرایش: 01

کد: ATH-ED/ED- 07

منبع: راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان (بازنگری سوم)

جفت سرراهی، پارگی سینوس مارژینال یا عروق سرراهی یادکولمان جفت (کنده شدن جفت) از اورژانس های مامایی محسوب می شوند که می توانند منجر به بروز خونریزی شوند.

علل خونریزی ها

- 1- جفت سرراهی
- 2- جدا شدن جفت که از اورژانس های مامایی محسوب می شود.

جفت سرراهی

به قرارگیری جفت در محلی غیر از محل طبیعی خود در حفره رحم گفته می شود. به طور مثال بروی دهانه رحم یا در مجاورت آن، جفت سرراهی گفته می شود.

علائم

- 1- معمولاً در سه ماهه سوم حاملگی رخ می دهد.
- 2- خونریزی بدون درد است.

درمان

در مسئله درمان موضوع مهم که نباید فراموش شود ممنوعیت معاینه واژینال در موارد جفت سر راهی می باشد. چرا که حتی با یک بار معاینه واژینال می تواند منجر به بروز خونریزی قابل توجه شده

و حیات مادر و جنین را به مخاطره اندازد در صورتی که خونریزی و واژینال در سه ماهه سوم بارداری باشد تیم احیای نوزاد و اتاق عمل به طور همزمان آماده خواهند شد.

طراحی و چاپ: روابط عمومی بیمارستان آتیه

آدرس بیمارستان:

شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دامن

تلفن بیمارستان: 82721

فاکس بیمارستان: 88086095

www.atiehospital.ir

