

پلاویکس Plavix



تهیه و تنظیم مطالب: دکتر مهناز منشادی (مدیر نظارت بر دارو)

تاییدکننده: دکتر آرسیس احمدیه

طراحی و چاپ: روابط عمومی و انتشارات بیمارستان آتیه



آدرس: تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و

شهید دادمان، بیمارستان آتیه

تلفن: ۸۲۷۲۱

www.atiehhospital.ir

چه مدت باید پلاویکس مصرف کنید؟

ادامه مصرف پلاویکس تا مدت مشخص شده توسط پزشک بسیار حائز اهمیت است. این مسئله به خصوص در بیمارانی که تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر قرار گرفته اند مهم تر است. چون قطع زودتر از موعد دارو می تواند سبب ایجاد لخته و گرفتگی در عروق قلب و فتر گردد. در افرادی که آنژیوپلاستی عروق قلب (کارگذاری فتر) شده اند مدت زمان مصرف دارو بر اساس نوع استنت(فتر) فرق می کند. بیمارانی که فتر دارویی برای آنان استفاده شده است لازم است مدت طولانی تری از این دارو استفاده کنند که این مدت حداقل شش ماه تا یک سال می باشد. در بیمارانی که فتر غیر دارویی دارند حداقل مدت یک ماه از این دارو باید استفاده کنند. البته توصیه می شود که در مورد ادامه یا قطع داروی پلاویکس حتماً با پزشک معالج خود مشورت کنید.



Plavix

پلاویکس یک داروی ضد پلاکتی است که مانع از تشکیل لخته در رگ های خونی می شود و ثابت شده است خطر بروز مجدد سکته مغزی و یا حمله قلبی را کاهش می دهد.

موارد مصرف:

این دارو برای بیماریانی که در معرض خطر حمله قلبی و سکته مغزی هستند، توسط پزشکان تجویز می شود.

مقدار مصرف:

الف) جهت کاهش وقایع آترواسکلروتیک (سکته قلبی و مغزی، مرگ ناشی از بیماری های عروقی) در بیماران مبتلا به آترواسکلروز و سکته مغزی و قلبی اخیر و یا بیماری عروقی محیطی.

بزرگسالان: ۷۵ mg خوراکی یک بار در روز، با یا بدون غذا.
ب) بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار و سکته قلبی (غیر موج Q) شامل بیماریانی که تحت (PCI یا بدون فنر) قرار گرفته اند.
بزرگسالان: ابتدا ۳۰۰ mg خوراکی به صورت تک دوز بارگزاری مصرف شده و سپس ۷۵ mg روزانه به همراه ۳۲۵-۷۵ mg آسپرین یک بار در روز استفاده گردد. در فاز حاد می توان از هپارین استفاده نمود.

پ) سکته قلبی با افزایش ارتفاع قطعه ST
بزرگسالان: ۷۵ mg خوراکی یک بار در روز به همراه آسپرین، با یا بدون داروهای ترومبولیتیک استفاده شود. ممکن است از یک دوز بارگزاری ۳۰۰ میلی گرمی نیز استفاده شود.

عوارض احتمالی:

خونریزی گوارشی، خونریزی کلیوی، تب، تشنج، خارش، قرمزی و تورم پوست، درد عمومی بدن، تغییر حالات روانی، کبودی پوست

چه اطلاعاتی را باید درباره داروی پلاویکس بدانیم؟

از آنجا که پلاویکس مانع از ایجاد لخته خونی می شود، می تواند باعث تشدید خونریزی حتی متعاقب یک آسیب جزئی گردد. بنابراین باید متعاقب بروز خونریزی که متوقف نمی شود، به پزشک خود مراجعه و با او مشاوره نمایید.

در موارد زیر فوراً به پزشک خود مراجعه کنید:

- ۱- هرگاه با خونریزی در یکی از اعضا خود مانند معده و روده روبرو شدید.
- ۲- مشاهده مدفوع خونی یا سیاه رنگ.
- ۳- استفراغ خونی یا سرفه هایی به همراه دفع خون.
(بیمارانی که پلاویکس مصرف می کنند باید از نوشیدن الکل جداً خودداری نمایند. زیرا الکل می تواند میزان خونریزی از معده و روده را افزایش دهد)
- ۴- در صورتی که قرار است بیمار تحت عمل جراحی قرار گیرد یا روی دندان هایش عملی انجام گردد، حتماً موضوع مصرف پلاویکس را به اطلاع پزشک مربوطه برساند. زیرا در مواردی، لازم است که حداقل ۵ روز قبل از انجام اعمال مذکور از مصرف پلاویکس خودداری شود. تا مانع از خطر افزایش خونریزی غیر قابل کنترل گردد.

هرگز در زمانی که تحت درمان با پلاویکس هستید، بدون مشورت پزشکتان از داروهای مسکن (داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی) از قبیل ایبوپروفن، دیکلوفناک و مفنمیک اسید و... استفاده نکنید.

قبل از مصرف پلاویکس چه نکاتی را باید به کادر درمانی خود اظهار کنم؟

در صورتی که به پلاویکس آلرژی و حساسیت دارید، یا اگر مبتلا به خونریزی فعال مانند خونریزی از زخم معده و یا خونریزی مغزی (ناشی از ضربه مغزی) هستید، هرگز پلاویکس مصرف نکنید.

قبل از مصرف پلاویکس هرگونه حساسیتی که نسبت به داروها دارید را پزشک به خود بگوئید. همچنین موارد زیر را نیز به اطلاع او برسانید:

- ابتلا به بیماری کلیوی
- وجود هرگونه اختلال انعقادی خونی مانند بیماری هموفیلی
- سابقه سکته مغزی از قبیل TIA (سکته خفیف مغزی)
- ابتلا به زخم معده یا بیماری کولیت السراتیو
- ابتلا به بیماری کبدی
- بیمارانی که از ازدیاد ترشح اسید معده رنج می برند می توانند از داروهایی مثل فاموتیدین یا سایمتیدین و یا پنتوپرازول استفاده نمایند. این دارو با امپیرازول تداخل اثر دارد و از مصرف همزمان این دو بایستی خودداری نمود.