



آنژیوگرافی



تهیه کننده: واحد آموزش - بخش آنژیوگرافی

تائید کننده: مدیر گروه قلب و عروق

تاریخ تدوین: ۱۴۰۳/۶/۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۸/۶/۱

ویرایش: ۰۰

کد: ATH-ED/ED-92

منبع: کتاب مرجع پرستاری ویژه برونر سوارث



طراحی و چاپ: روابط عمومی بیمارستان آتیه

آدرس: تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان

تلفن بیمارستان: ۸۲۷۲۱

فاکس بیمارستان: ۸۸۰۸۶۰۹۵

سایت بیمارستان: www.atiehhospital.ir

- به برگه آموزش به بیمار زمان ترخیص که توسط بخش ارائه می شود توجه کافی داشته باشید
- شماره تلفن بخش داخل برگه جهت تماس ضروری و فوری ثبت گردیده است

آنژیوگرافی

یکی از متداول ترین روشهای تشخیصی برای بررسی عروق خونی می باشد. در این روش تشخیصی تنگی یا انسداد عروق و همچنین گشادی غیر طبیعی عروق بررسی می شود. ارگانهایی مثل قلب، مغز، کلیه، اندام دست و پا را می توان از این طریق بررسی نمود. آنژیوگرافی یک اقدام تهاجمی است که از طریق تزریق ماده حاجب و عکسبرداری توسط اشعه X می توان مسیر عروق و ماهیت عروق را بررسی نمود. جهت انجام این پروسیجر می توان از شریان ساعد دست راست و شریان کشاله ران استفاده نمود.



اقدامات و توجهات لازم قبل، حین و بعد از آنژیوگرافی

قبل از آنژیوگرافی:

- نیاز است محل آنژیوگرافی، ساعد دست ها یا کشاله ران ها شیو شود.

- حمام قبل از پروسیجر انجام شود.

- چند ساعت قبل از عمل (طبق دستور پزشک معالج) از خوردن مواد غذایی اجتناب گردد.
- به همراه داشتن نوار قلب و آزمایشات مورد نیاز ضروری است
- در صورت داشتن بیماری های کلیوی، دیابت، حساسیت های دارویی و غذایی خاص پزشک و پرستار را مطلع نمایید.
- بیماران دیابتیک که متفورمین مصرف می کنند از دو روز قبل داروی خود را قطع نمایند(عوارض کلیوی دارد)



حین انجام پروسیجر:

- بر روی تخت آنژیوگرافی به پشت خوابیده و در طول زمان آنژیوگرافی بیدار هستید و می توانید با پزشک در ارتباط باشید.
- محل مورد نظر را با داروی بی حسی بدون درد می نمایند تا احساس بدی نداشته باشید
- طول مدت انجام پروسیجر ۱۵ دقیقه خواهد بود. یک عدد سوزن (کاتتر آنژیوگرافی) در محل دست یا پا وارد می گردد. از طریق آن ماده حاجب تزریق و همزمان عکسبرداری توسط دستگاه انجام می گیرد.

پس از اتمام پروسیجر:

- بدون انجام هر نوع حرکتی با برانکارد به بخش منتقل می شوید.
- تا چند ساعت به پشت خوابیده و محل هایی که پرستار تذکر می دهد را حرکت نمی دهید.
- سوزن آنژیوگرافی خارج می گردد روی موضع فشار ایجاد می شود.
- جهت کنترل خونریزی از کیسه شن استفاده می شود که در انتهای پانسمان موضع قرار می گیرد
- با توجه به شرایط موجود و نداشتن مشکل می توانید پس از ۶-۸ ساعت پس از انجام آنژیوگرافی از بیمارستان ترخیص شوید.

پس از ترخیص تا ۲۴ ساعت:

- در صورت انجام پروسیجر بر روی پا از پله بالا و پایین نروید
- از توالف فرنگی استفاده نمایید.
- در صورت امکان چک و کنترل فشار خون می تواند کمک کننده باشد
- در صورت بروز هر گونه مشکل مانند احساس درد شدید در محل آنژیوگرافی- تورم □ قرمزی- خونریزی □ ضعف و بی حالی و عدم تعادل سریعاً به پزشک یا پرستار و بیمارستان اطلاع داده شود و مراجعه نمایید.
- در صورت انجام آنژیوگرافی در دست تا یک هفته با دست راست که پروسیجر روی آن انجام شده وزنه سنگین بلند نکنید
- رانندگی یا کار سنگین انجام ندهید.

