



- بیمار را ارزیابی کنید.
- پزشک یا بیمارستان مقصد را مطلع کرده و اقدامات زیر را انجام دهید.

ترومای شکمی

در تمامی موارد

- ارزیابی
- احیاء
- کنترل وضعیت

زخم های نافذ

زخم ناشی از چاقو

- ممکن است سطحی به نظر برسد در حالی که ممکن است بسیار عمیق باشد
- وسیله ایجاد کننده زخم را که در داخل بدن باقی مانده دستکاری نکنید
- در صورت امکان اطلاعات کاملی در خصوص عامل ایجاد زخم به دست بیاورید از قبیل:
 - نوع
 - عرض
 - طول

زخم ناشی از گلوله

- محل ورود و خروج زخم را مشخص کنید
- به دنبال سوختگی ناشی از باروت در اطراف زخم باشید
- اطراف زخم را تمیز نکنید

اقدامات اورژانس

- NPO
- اطمینان از وجود راه هوایی موثر
- تجویز اکسیژن 12-15LPM از طریق ماسک صورت
- احتمال آسیب ستون مهره ها را در نظر بگیرید.
- برقراری خط وریدی
- احشاء بیرون زده را با پانسمان آغشته به نرمان سالین گرم بپوشانید .
- کنترل مداوم علائم حیاتی
- نمونه خون برای آزمایشات کامل خون، گروه خون و کراس میچ بگیرید.
- در صورتی که $SBP < 80$ باشد طبق دستور پزشک معالج جایگزینی مایعات را آغاز کنید
- لباسهای بیمار را خارج کنید .
- قسمت قدامی خلفی شکم بیمار و پرینه وی را به طور کامل معاینه کرده و دنبال علائمی مانند تندرنس، زخم و خراش باشید. علائم باقی مانده روی لباس بیمار ممکن است نشانه های مهمی باشند.
- صداهای روده را گوش کنید

اطلاعات مربوط به حادثه

- علت ایجاد حادثه
- مکانیسم
- تاریخچه بیماریهای قبلی
- حاملگی

مداخلات احتمالی

- سونداژ ادراری
- آزمایش کامل ادرار
- NGT

ترومای غیر نافذ

به دنبال علائم زیر باشید

- درد نوک شانه
- کبودی، حساسیت در لمس، حساسیت برگشتی در لمس
- وجود ترومای لگن
- تغییر وضعیت بیمار

اعزام فوری