



- بیمار را ارزیابی کنید.
- پزشک یا بیمارستان مقصد را مطلع کرده و اقدامات زیر را انجام دهید.

درد شکم

اقدامات اورژانس

- از وجود راه هوایی مناسب مطمئن شوید، در صورتی که بیمار سیانوز بوده یا دیس پنه داشته باشد اکسیژن از راه ماسک بدهید.
- از گردش خون کافی بیمار مطمئن شوید.
- شرح حال مختصر بگیرید.

وضعیت بیمار وخیم می باشد

با پزشک متخصص تماس بگیرید

- علائم حیاتی را به طور سریال کنترل کنید
- از نظر وجود علائمی مانند تهوع، استفراغ، بی اشتها، اسهال و یبوست بیمار را بررسی کنید
- راه وریدی را برقرار کنید
- جهت آزمایشات اوره، الکترولیت، گروه خون، کراس منج و آمیلاز خون گیری کنید
- از وجود نبض های فمورال و محیطی مطمئن شوید
- در صورت درد اپیگاستر یا درد قفسه سینه بعد از گرفتن ECG بیمار را مانیتورینگ نمائید
- در صورت هیپوولمی ممکن است نیاز به جایگزینی مایعات از راه وریدی باشد
- تجویز داروی مسکن وریدی
- شکم، قفسه سینه، پشت، پرنیه و کانال آنال را معاینه کرده و صداهای روده را چک کنید

وضعیت بیمار وخیم نمی باشد

تشخیص های افتراقی

- پریتونیت، گاستروآنتریت
- عفونتهای دستگاه ادراری، رنال کولیک
- اولسر
- انسداد روده
- آپاندیسیت
- مسمومیت غذایی
- کوله سیستیت
- پانکراتیت
- طحال پاره شده
- انسداد عروقی
- آنوریسم آئورت شکمی
- حاملگی خارج از رحم
- کیست تخمدان یا بیماری های التهابی لگن
- تورسیون بیضه ها

- علائم حیاتی را کنترل کنید
- آزمایش کامل خون و ادرار
- NPO
- کنترل صداهای روده
- شرح حال کامل
- تاریخچه قبلی
- داروهایی که مصرف می کند
- آلرژی ها
- کارکرد مثانه و روده
- احتمال حاملگی